

## دنور

دنور یا ناحیه دهنده محلی است که از آنجا پوست برداشته شده و به محل دیگری پیوند زده می شود.

### شرایط و چگونگی انتخاب محل دنور

در شرایط حساس مثل سوختگی های وسیع انتخاب محل برای برداشتن پیوند محدود به مناطق سالم می باشد ، با این حال در اغلب بیماران میتوان محل برداشتن پوست را با تفکر دقیق و با توجه به نیازهای محل گیرنده پیوند انتخاب کرد. این نیازها شامل کیفیت ، ضخامت ، پیگمانتاسیون و خاصیت مو زدایی ناحیه دنور می باشد .

از طرفی تغییر شکلی که در ناحیه بوجود می آید باید در نظر گرفته شود، برای جلوگیری از دیده شدن اسکار میتوان از نواحی پوشیده بدن

(بالای ران ، باسن و پشت گردن ) پوست برداشت کرد.

پوست برداشته شده از شکم و باسن و ران اغلب تمایل به تیره شدن دارد در حالی که پوست برداشته شده از پشت گوش و بالای ترقوه رنگ بهتری دارند .

پوست نازک خاصیت موزائی را با خود انتقال نمی دهد در حالی که در پوست با ضخامت زیاد و کامل این حالت منتقل می شود.

### روند بهبودی دنور

محل دنور یک زخم تمیز است . از آنجاییکه محل دنور دارای زخم با ضخامت نسبی است بسیار دردناک بوده و مستعد عفونت می باشد.

با مراقبت مناسب از محل دنور ، بهبود خود به خود زخم طی ۷ الی ۱۴ روز حاصل می شود.معمولا ۷۲ ساعت بعد از عمل ، بانداژ ناحیه


دنور برداشته می شود و ناحیه دنور با یک لایه گاز وازلین و گاز خشک پوشانده می شود. روزانه حاشیه گازهایی که از زخم جدا شده ، چیده می شود. تا زمان جدا شدن خودبه خودی گازها ، محل دنور نباید شستشو داده شود و دائما باید در معرض هوا باشد.



### مراقبت از محل دنور

مراقبت های قبل از عمل ناحیه دنور، شستشوی ناحیه و پاک کردن موهای عضو است.

نکته اساسی در پوشانیدن محل دنور جلوگیری از صدمه مکانیکی و خشک شدن آن است .



دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز پزشکی آموزشی درمانی ۱۵ خرداد

دنور

واحد آموزش دفتر پرستاری

لازم از قبیل استفاده از آنتی بیوتیک موضعی را  
بایستی انجام داد.

استفاده از پانسمان باعث کاهش تسریع در روند  
بهبودی دنور شده و از طرفی باعث کاهش درد و  
افزایش رشد اپتلیال پوست می گردد.

بعد از جدا شدن پانسمان ، باید محل دنور  
بوسیله وازلین یا مواد چرب کننده دیگر نرم نگه  
داشته شود.



اگر چه بواسطه وسایل همانند Heat Lamp یا  
سشوار می توان محل برداشت پوست یا دنور را  
سریعتر خشک کرد ، ولی این عمل باعث تاخیر  
در اپیتلازاسیون محل دنور شده واز طرفی  
خشک شدن محل باعث درد و ناراحتی در موقع  
راه رفتن و حرکت خواهد شد .

علائم و نشانه های التهاب محل دنور را بررسی و  
برای جلوگیری از عفونت محل دنور اقدامات